

Información para el Paciente

Cirugía Vitreoretiniana

RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS:

Para que se obtengan los resultados deseados, necesitamos de su colaboración. El día de la cirugía debe seguir las siguientes recomendaciones:

- Si está en tratamiento con anticoagulantes orales, tipo SINTROM, debe consultar a su hematólogo para valorar la conveniencia de retirarlo, o cambiar el tratamiento por heparina.
- No debe ingerir alimentos o bebidas durante las 6 horas anteriores a la intervención.
- Para evitar posibles infecciones, es recomendable ducharse el día antes de la intervención y la misma mañana si es posible, con GERMISDIN antiséptico PH4 (ISDIN) poniendo especial atención alrededor de los ojos y en la cara en general.
- No utilice ningún tipo de maquillaje o crema en la cara o alrededor de los ojos, ni esmalte en las uñas.
- Recomendamos que asistan a la clínica sin anillos, colgantes y/o pendientes.
- Se rogaría que se limitase el número de acompañantes en la sala de espera a una o dos personas, en beneficio del bienestar y tranquilidad del paciente que será intervenido.
- Los pacientes usuarios de lentes de contacto deben interrumpir su uso durante los cinco días previos a la cirugía, si en la misma intervención se opera también la catarata.

Tratamiento PREOPERATORIO:

PAUTA DE DILATACIÓN: Iniciar el día de la cirugía

Dp/ FENILEFRINA COLIRIO

Dp/ TROPICAMIDA COLIRIO

Instilar en el ojo que se va a operar 1 gota de cada colirio (no importa el orden), 2 veces antes de la hora que tenga programada la cirugía: 1 hora antes y 1/2 hora antes.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área "Mi Quirónsalud" de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud