


Informació per al Pacient

MARCAPASSOS

HA DE SABER

- És un sistema generador d'impulsos, dissenyat per controlar i tractar el ritme cardíac, tant si és massa ràpid, lent o irregular. Ajudarà al seu cor a bategar a un ritme constant.
- S'implanta normalment al pit, sota la pell. Porta un o més elèctrodes (cables) que arribaran fins al seu cor. Els elèctrodes transmeten les senyals del cor al marcapassos, on son interpretades i es procedeix a enviar els impulsos necessaris per estimular el seu ritme.
- El dispositiu emmagatzema també informació sobre el funcionament del cor. El metge podrà revisar tota aquesta informació mitjançant un ordinador anomenat programador.
- Existeixen varis tipus de marcapassos.



ABANS DE LA IMPLANTACIÓ:

- Haurà de comunicar-li al seu metge la medicació que pren actualment, per a que ell decideixi el que ha de suspendre o canviar per a la intervenció. Li indicaran la medicació que pot prendre amb un glop d'aigua fins a 2 hores abans de la intervenció.
- Ha de complir les indicacions preoperatòries relatives a la higiene (que es realitzarà amb solució de clorhexidina), el dejú de sis hores (inclosa la restricció de NO beure aigua) i la medicació.
- Al arribar ha de dirigir-se a Admissions.
- Porti roba còmoda per a l'ingrés hospitalari.
- Vingui acompanyat.

DESPRÈS DE LA INTERVENCIÓ:

- Precaucions: Mantingui immobilitzat el braç on porta el marcapassos durant les primeres 24 hores després de la col·locació, per evitar el desplaçament del mateix. Durant les dues primeres setmanes després de la intervenció, haurà de limitar la mobilitat del braç del costat on s'ha implantat el dispositiu. El podrà aixecar sense superar l'alçada de l'espatlla.
- Els primers dies és normal que tingui la zona inflamada, calenta o que apareguin hematomes. A mida que passin els dies, tot anirà desapareixent.
- Li donaran l'alta amb la zona tapada amb un pegat hidrocoloide que no ha de treure's. En cas que la ferida supuri i traspassi el pegat, consulti amb el nostre centre, però sense retirar el pegat.
- Aquest pegat pot mullar-se, però només per dutxar-se. Pot fer-ho, sense fregar sobre la zona.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área "Mi Quirónsalud" de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud

- Als 15 dies haurà de presentar-se a Consultes Externes per a realitzar la cura. En aquell moment, es retirarà l'apòsit i les grapes de la ferida.
- Prengui la medicació indicada pel seu metge seguint la pauta d'horari i dosis.
- El seu metge l'indicarà quan pot reincorporar-se a la seva vida laboral o realitzar les activitats diàries.
- Tingui sempre a mà la targeta amb la informació referent al dispositiu i a la seva programació.
- Depenent del tipus de dispositiu col·locat, pot ser que no se li entregui la targeta després de la intervenció i la rebrà per correus certificat al seu domicili.
- Vagi als controls mèdics periòdics per a la verificació del correcte funcionament del seu dispositiu.

ALTRES COSES A TENIR EN COMPTE SI PORTA MARCAPASSOS



- Utilitzar aparell de RX.
- Utilitzar comandaments a distància de TV, ràdio...
- Detectors de metalls.
- Mantes, màquines d'afaitar elèctriques ...
- Mantenir relacions sexuals.
- Practicar esport de forma moderada, que no impliqui cops o impactes a la zona. Es recomana fer l'activitat acompanyat.
- Ús de telèfon mòbil, es recomana allunyar-se 15 cm del dispositiu.



- Motors amb imants potents.
- Radioteràpia.
- Alguns aparells de consultes dentals.
- Ressonància magnètica (alguns dispositius).
- Motxilles, bosses, sostenidors molt ajustats... que facin pressió a la zona.
- Equips de soldar.
- Instruments vibradors.
- Plaques d'inducció de la cuina

- Si ha de viatjar o realitzar proves diagnòstiques per altres problemes de salut, AVISI SEMPRE que porta un marcapassos implantat.
- Segueixi les instruccions que li han donat pròpies del marcapassos.

HA D'EVITAR

- Aixecar objectes pesats i realitzar moviments bruscos amb l'extremitat del costat del MCP, fins que la ferida estigui totalment cicatritzada (normalment durant les dues primeres setmanes).
- Gratar el dispositiu o la zona del pit al voltant del mateix.
- Les plaques d'inducció de la cuina poden interferir en el seu funcionament, es recomana evitar-les.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área "Mi Quirónsalud" de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar

Grupo  quirónsalud

SIGNES D'ALARTA



- Comuniqui qualsevol enrogiment, inflamació o secreció de la ferida que aparegui passats els dies de recuperació.
- Si té febre superior a 38°C.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área “Mi Quirónsalud” de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud