

Información para el Paciente

CHALAZION

¿QUÉ ES?

La cirugía de **chalazión** se realiza con anestesia local y consiste en realizar una pequeña incisión por la parte interior del párpado afectado para extraer el contenido de la glándula afectada sin dejar ninguna marca visible. Es una cirugía breve y muy poco agresiva.

- **No debe frotarse los ojos o cerrar con fuerza los párpados**, así como tampoco agachar la cabeza ni para calzarse ni realizar esfuerzos físicos, puesto que podría desplazarse la lente intraocular o subir la presión del ojo intervenido y abrir la herida quirúrgica.
- Es normal notar sensación de roce o “arenilla” uno o dos días tras la cirugía. No existe ningún inconveniente en ver televisión o leer si se lo permite su visión.
- Instilar el colirio antibiótico según las pautas marcadas por su oftalmólogo. Si considera además necesario el empleo de algún otro tratamiento se lo hará saber y le indicaran las pautas oportunas.
- Sería recomendable no dormir durante las primeras noches sobre el lado del ojo intervenido, haciéndolo boca arriba o del lado contrario.
- Además, **puede emplear algún analgésico vía oral para reducir las molestias (distinto de aspirina, por ejemplo, paracetamol o metamizol magnésico: nolotil)**.
- En el supuesto de notar síntomas diferentes a los que ya le han sido explicados como habituales (escozor, lagrimeo, visión borrosa, sensibilidad aumentada a la luz y deslumbramiento).

OBSERVE

- Si inflamación o mal olor en la zona o secreciones.
- Pérdida de visión
- Si dolor importante que no cede con analgesia.
- Si temperatura mayor de 38º C.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU ENFERMERA / MÉDICO DE REFERENCIA O ACUDA AL SERVICIO DE URGENCIAS.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área “Mi Quirónsalud” de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud