

Informació per al Pacient

IMMUNOTERÀPIA ESPECÍFICA AMB AL·LÈRGENS

La vacuna o immunoteràpia és el tractament específic que té com a objectiu millorar o fer desaparèixer la malaltia al·lèrgica una vegada finalitzat el tractament. La durada variarà entre 3 a 5 anys segons la resposta.

Consisteix en l'administració per via subcutània de dosi en augment de la substància que produeix l'al·lèrgia per normalitzar la resposta del sistema immunitari.

- S'ha d'administrar sempre en un centre sanitari. MAI al seu domicili, ja que no està totalment exempta de riscos, podent produir reaccions locals a la zona d'injecció, o més rarament reaccions generals.
- Es seguirà la pauta d'administració adjunta a l'envàs excepte especificació per part del seu al·lèrgic. És important respectar els períodes entre cada injecció assenyalats a la cartilla de seguiment. Si per qualsevol causa es demora l'administració, indiqui-ho si fos necessari variar les dosis posteriors.
- Indiqueu també canvis en la seva medicació habitual i malalties actuals (febre, infecció respiratòria, crisi asmàtica, afecció cutània severa, ...) o si ha rebut vacunes amb virus vius en els últims 10 dies.
- La vacuna s'ha de conservar a la nevera, preferiblement a la porta, MAI al congelador.
- No oblidis tramitar la seva recepta amb antelació, tenint en compte que pot trigar a tenir la vacuna entre 15 i 30 dies.

NORMES PER VENIR A IMMUNOTERÀPIA

- Haurà d'acudir asimptomàtic i no haver precisat utilitzar broncodilatadors (Ventolín®, Terbasmin® o Salbutamol) els 3 dies previs. Si vostè té una crisi d'asma o asma inestable, no s'haurà de vacunar.
- No ha d'abandonar la medicació habitual.
- Després administrar la dosi , haurà d'esperar un mínim de 30 minuts en observació per controlar si hi ha hagut reacció.
- No ha de fer exercici físic ni prendre banys d'aigua calenta o saunes a les pròximes 6 hores .
- Si aparegués una reacció local tardana al seu domicili : l'ha de marcar-la amb un plàstic transparent i porti'l a la pròxima cita per valorar la dosi . Apliqui gel , no es rasqui, i en cas necessari prengui un antihistamínic.
- Si està embarassada o pensa estar-ho , haurà d'indicar-ho per no iniciar el tractament. En cas d'estar amb dosis de manteniment no requereix modificar el tractament.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área "Mi Quirónsalud" de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud